



Rosa rubrifolia.

Rosier à feuilles rougeâtres.

J. J. Poir.

Suppl. de R.

Chapuis.

LES ROSES.

D

ROSA RUBRIFOLIA.

R. parvifolia (Poir.) *parvifolia* glabra *parvifolia*, *petala* *arabica*, *caule* *erectis* *ramulis* *ramulis*, *foliis* *oblongis* *argute* *seratis*, *glabris* (*glabris* *erectis*). *Rosae* *rubrifolia*. *Willd.* *Spec. 3*, pag. 1074. *Pars. 2*, 3a. *Vol. Fl. de Dauph. 3*, pag. 343.
R. (Mulliflora) *Roemer.* *Bot. Soc. Linn.* 1, pag. 70.
R. (Candor.) *fol.* *glabris* *rubellus* *minor*, *floribus* *rubris*. (*Var. 4*) *Seyx.* *Flor. Helv.* 4, pag. 308, n° 13.
Rosae à *feuilles* *rougeâtres*, *U.C.* *Nouv. Fl. Franç.* 3711.
R. (Glauca) *Desaux.* dans *(Hist. des arbres et arbrisseaux de Dictionnaire)*, 2, pag. 165.

ROSIER À FEUILLES ROUGEÂTRES.

DESCRIPTION.

Cet arbrisseau, rougeâtre et recouvert d'une poussière glauque dans toutes ses parties, forme un buisson dont les tiges s'élèvent jusqu'à huit, et même dix pieds, plus ou moins, selon le site dans lequel il végète. Ses tiges sont armées d'aiguillons fermes et recourbés. Les feuilles, munies à leur base de deux stipules entières, se composent de cinq, sept, et quelquefois de neuf folioles ovales-oblongues, molles au toucher, dentées en arc, glabres, glauques d'une teinte vermeille, perpendiculairement en-dessous; leur pétiole est aussi d'aiguillons jaunâtres. Les fleurs rouges, dans leur jeunesse, et d'un blanc-vertâtre dans leur entier développement, sont disposées en bouquet au sommet des rameaux. Chaque pe-

